

診療科

病名

検索

詳細表示

レジメンNo.	レジメン名称	ケール日数	最大回数
Pro-R-01	リツキサン(375mg/m <sup>2</sup> )	28日	4回迄
Pro-R-02	リツキサン(375mg/m <sup>2</sup> ) 単回投与(メソテナンス用)	7日	999回迄

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)
注射	1	点滴 点滴 ボラミン注5mg/1mL 生理食塩液【50mL】	1 ml 1ﾌﾟﾗﾊﾞｯｸ	15分で	時間未定	時間未定	時間未定	時間未定
	2	点滴 点滴 Hリツキサン注【500mg】50mL[限] 状態見て30分毎に投与速度アップ可 生理食塩液500mL 投与速度最大200mg/hrまで	375 mg /m <sup>2</sup> 2 袋	初回25mg/hrから開始	時間未定	時間未定	時間未定	時間未定
	1	ロキソプロフェン錠60mg(ロキソニン) 1日2回 朝・夕食後	2 錠		●			
	1	ロキソプロフェン錠60mg(ロキソニン) 1日2回 朝・夕食後	2 錠			●		
処方	1	ロキソプロフェン錠60mg(ロキソニン) 1日2回 朝・夕食後	2 錠				●	
	1	ロキソプロフェン錠60mg(ロキソニン) 1日2回 朝・夕食後	2 錠					●
コメント								

やめる

削除

新規

修正

流用