

化学療法レジメン

| がん種   | レジメンNo   | レジメン名称                                      |          | 1コースの日数 |   |   |   |    |    |    | 総コース数    |
|-------|--|---|----------|---------|---|---|---|----|----|----|----------|
| 小細胞肺癌 | Pro-3-K-16a  | イミフィンジ(1500mg/body)+CBDCA(5AUC)+ETP(100mg/m |          | 21日     |   |   |   |    |    |    | 999コースまで |
| 番号    | 医薬品名   | 1日投与量                                       | 投与方法     | 1       | 2 | 3 | 4 | .. | .. | 21 | 備考       |
| 1     | 生理食塩液50mL  | 50mL  | 点滴静注15分  | ●       |   |   |   |    |    |    |          |
| 2     | 生理食塩液100mL<br>イミフィンジ点滴静注500mg/10mL                     | 100mL<br>1500mg/body                        | 点滴静注60分  | ●       |   |   |   |    |    |    |          |
| 3     | 生理食塩液50mL  | 50mL  | 点滴静注15分  | ●       |   |   |   |    |    |    |          |
| 1     | ホスアプレピタント点滴静注用150mg<br>生理食塩液250mL                      | 150mg<br>250mL                              | 点滴静注30分  | ●       |   |   |   |    |    |    | 悪心嘔吐予防   |
| 2     | 生理食塩液20mL  | 20mL  | 静脈ワンショット | ●       |   |   |   |    |    |    |          |
| 2'    | 5%ブドウ糖注射液100mL   | 100mL                                       | 点滴静注30分  |         | ● | ● |   |    |    |    |          |
| 3     | 生理食塩液100mL<br>デキサート注射液6.6mg/2mL<br>パロノセトロン静注0.75mg/5mL | 100mL<br>6.6mg<br>0.75mg                    | 点滴静注30分  | ●       |   |   |   |    |    |    | 悪心嘔吐予防   |
| 4     | 生理食塩液500mL<br>エトポシド点滴静注液100mg/5mL                      | 500mL<br>100mg/m2                           | 点滴静注60分  | ●       | ● | ● |   |    |    |    |          |
| 5     | 5%ブドウ糖注射液250mL<br>カルボプラチン点滴静注液450mg/45mL               | 250mL<br>5mg/GFR+25                         | 点滴静注60分  | ●       |   |   |   |    |    |    |          |
| 6     | ソルデム3A輸液500mL  | 500mL                                       | 点滴静注60分  | ●       | ● | ● |   |    |    |    |          |