

化学療法レジメン

がん種		レジメンNo	レジメン名称		1コースの日数					総コース数
大腸癌		Pro1-D-02	mFOLFOX-6+ベクティビックス療法		14日					999回まで
番号	医薬品名	1日投与量	投与方法	1	2	3	..	..	14	備考
1	デキサート注射液6.6mg/2mL 5%ブドウ糖注射液100mL	6.6mg 100mL	点滴静注30分	●						悪心嘔吐予防
2	パロノセトン静注0.75mg/5mL	0.75mg	静脈ワンショット	●						悪心嘔吐予防
3	ベクティビックス点滴静注100mg/5mL 生理食塩液100mL	6mg/kg 100mL	点滴静注60分	●						
4	レボホリナート点滴静注25mg 5%ブドウ糖注射液500mL	200mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴静注120分	●						
5	オキサリプラチン点滴静注液 100mg/20mL 5%ブドウ糖注射液250mL	85mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注120分	●						
6	フルオロウラシル注1000mg/20mL 生理食塩液50mL	400mg/m <sup>2</sup> 50mL	点滴静注30分	●						
7	フルオロウラシル注1000mg/20mL 生理食塩液500mL	2400mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴静注46時間	●						
8	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg	朝食後		●	●				悪心嘔吐予防
9	デカドロン錠0.5mg	4mg	朝夕食後		●	●				悪心嘔吐予防