

化学療法レジメン

| がん種 |  | レジメンNo                         | レジメン名称             |   | 1コースの日数 |   |    |    |    | 総コース数  |  |
|-----|--|--------------------------------|--------------------|---|---------|---|----|----|----|--------|--|
| 大腸癌 |  | Pro1-D-04                      | FOLFIRI+ベクティビックス療法 |   | 14日     |   |    |    |    | 999回まで |  |
| 番号  | 医薬品名                                   | 1日投与量                          | 投与方法               | 1 | 2       | 3 | .. | .. | 14 | 備考     |  |
| 1   | デキサート注射液6.6mg/2mL<br>5%ブドウ糖注射液100mL    | 6.6mg<br>100mL                 | 点滴静注30分            | ● |         |   |    |    |    | 悪心嘔吐予防 |  |
| 2   | パロノセトロン静注0.75mg/5mL                    | 0.75mg                         | 静脈ワンショット           | ● |         |   |    |    |    | 悪心嘔吐予防 |  |
| 3   | ベクティビックス点滴静注100mg/5mL<br>生理食塩液100mL    | 6mg/kg<br>100mL                | 点滴静注60分            | ● |         |   |    |    |    |        |  |
| 4   | レボホリナート点滴静注25mg<br>5%ブドウ糖注射液500mL      | 200mg/m <sup>2</sup><br>500mL  | 点滴静注120分           | ● |         |   |    |    |    |        |  |
| 5   | イリノテカン点滴静注液100mg/5mL<br>5%ブドウ糖注射液500mL | 150mg/m <sup>2</sup><br>500mL  | 点滴静注120分           | ● |         |   |    |    |    |        |  |
| 6   | フルオロウラシル注1000mg/20mL<br>生理食塩液50mL      | 400mg/m <sup>2</sup><br>50mL   | 点滴静注30分            | ● |         |   |    |    |    |        |  |
| 7   | フルオロウラシル注1000mg/20mL<br>生理食塩液500mL     | 2400mg/m <sup>2</sup><br>500mL | 点滴静注46時間           | ● |         |   |    |    |    |        |  |
| 8   | ナゼアOD錠0.1mg                            | 0.1mg                          | 朝食後                |   | ●       | ● |    |    |    | 悪心嘔吐予防 |  |
| 9   | デカドロン錠0.5mg                            | 4mg                            | 朝夕食後               |   | ●       | ● |    |    |    | 悪心嘔吐予防 |  |