化学療法レジメン

| がん種 | ﾚｼﾞﾒﾝNo | レジメン名称 | 1コースの日数 | 総コース数 |
|---|---|---|---|---|
| 非小細胞肺癌 | Pro3-J-42a | CBDCA(5AUC)+PTX(200mg/㎡)+Pembro(200mg/body) | 21日 | 999コースまで |

| 番号 | 医薬品名 | 1日投与量 | 投与方法 | 1 | 2 | 3 | ・・ | ・・ | ・・ | 21 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液50mL | 50mL | 点滴静注10分 | ● | | | | | | | | |
| 2 | 生理食塩液100mL<br>キイトルーダ点滴静注100mg/4mL | 100mL<br>200mg/body | 点滴静注30分 | ● | | | | | | | | |
| 3 | 生理食塩液20mL | 20mL | 静脈ワンショット | ● | | | | | | | | |
| 4 | 生理食塩液100mL<br>デキサート注射液6.6mg/2mL<br>ファモチジン静注20mg/20mL<br>パロノセトロン静注0.75mg/5mL | 100mL<br>19.8mg<br>20mg<br>0.75mg | 点滴静注30分 | ● | | | | | | | | 悪心嘔吐予防 |
| 5 | 生理食塩液20mL | 20mL | 静脈ワンショット | ● | | | | | | | | |
| 6 | ホスアプレピタント点滴静注用150mg<br>生理食塩液250mL | 150mg<br>250mL | 点滴静注30分 | ● | | | | | | | | 悪心嘔吐予防 |
| 7 | 生理食塩液100mL | 100mL | 点滴静注30分 | ● | | | | | | | | |
| 8 | ブドウ糖注射液5%500mL<br>パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL | 500mL<br>200mg/㎡ | 点滴静注180分 | ● | | | | | | | | |
| 9 | デキサート注射液6.6mg/2mL<br>生理食塩液20mL | 3.3mg<br>20mL | 静脈ワンショット | ● | | | | | | | | 悪心嘔吐予防 |
| 10 | 生理食塩液250mL<br>カルボプラチン点滴静注液450mg/45mL | 250mL<br>5mg/GFR+25 | 点滴静注60分 | ● | | | | | | | | |
| 11 | 生理食塩液250mL | 250mL | 点滴静注60分 | ● | | | | | | | | |
| 12 | レスタミンコーワ錠10mg | 5錠 | 経口・ケモ開始前 | ● | | | | | | | | アレルギー予防 |