

化学療法レジメン

| がん種 | レジメンNo | レジメン名称 | 1コースの日数 | | | | | | 総コース数 | |
|-----|--|-------------------------------|----------------------|---|---|----|---|----|--------|----------------|
| 大腸癌 | Pro1-D-13a | 大腸癌セツキシマブ(1.2回目)+wCPT-11 | 14日 | | | | | | 999回まで | |
| 番号 | 医薬品名 | 1日投与量 | 投与方法 | 1 | 2 | .. | 8 | .. | 14 | 備考 |
| 1 | デキサート注射液6.6mg/2mL 生理食塩液100mL | 6.6mg 100mL | 点滴静注30分 | ● | | | ● | | | 悪心嘔吐予防 IR予防 |
| 2 | アービタックス注射液100mg/20mL 生理食塩液500mL | 400mg/m ² 500mL | 点滴静注120分 | ● | | | | | | |
| 2' | アービタックス注射液100mg/20mL 生理食塩液500mL | 250mg/m ² 500mL | 点滴静注120分 | | | | ● | | | |
| 3 | 生理食塩液100mL グラニセトロン静注液1mgシリンジ | 100mL 1mg | 点滴静注60分 | ● | | | ● | | | |
| 4 | イリノテカン点滴静注液100mg/5mL 5%ブドウ糖注射液250mL | 150mg/m ² 250mL | 点滴静注90分 | ● | | | ● | | | |
| 5 | レスタミンコーワ錠10mg | 5錠 | アービタックス投与 1時間前に内服 | ● | | | ● | | | IR予防 |