薬剤師の先生方へ

患者さんに指導後、FAX送信よろしくお願い致します。**旭川医療センター FAX:0166-55-2961(薬剤科)**

m 1 比消却 +

7 7 TEI 1

			吸入指導報音書		人作	リ坦	1
【薬剤師記入ペー			ージ】 指導日 年		月		E
薬局名			薬剤師名				
患者氏名			患者ID				
指導を受けた人	□ ¾	7 人 [〕配偶者 □ 子供 □ ヘルパ- □ その他()				
指導回数	□ ;	初回	□ 2回目 □ 3回目 吸入薬使用歴 □ あり	ロな	l□	不明	
			評価の目安 1.できた 2.ほぼできた 3.なんとかで	きた 4.	できな	かった	<u>-</u>
	注	意	【共通必須項目】	1	2	3	4
アドヒアランス			服薬のタイミングについて話し合い、生活の中に組み入れる事ができている(歯磨き前、食事前) 1回の吸入量(回数)と1日の吸入回数について話すことができる	igspace			
	H		継続治療の重要性について理解している	+			
副作用			うがいの方法を理解し、かつ実行している				
			声がれ、口腔カンジダ、動悸などについて理解している				
以下の薬剤の指導			チェック項目	1	2	3	4
		1	キャップを取り、垂直にして色つきの回転グリップを確実に止まるまで右方向に回す(初回のみ回転グリップ操作①と②を3回繰り返す)				
		2	止まったら逆方向(左)に「カチッ」と音がするまで戻す	_			
①タービュヘイラー		3	空気の取り入れ口をふさがないように片手で持ち、はやく深く吸入すること ができる				
		4	2回以上吸入する場合は①~③の動作を繰り返す	╄			
		5	デバイスを振った時に出るカサカサ音は乾燥剤の音であり、薬剤の残量と 無関係であることを知っている				
			チェック項目	1	2	3	4
②ディスカス		1	吸入器を水平に持って構える				
		2	吸入口に吐きかけないようにしっかり息を吐いてから、強く深く「スーッ」と息 を吸い込む事ができる	٠			
		3	苦しくない程度に息を止める事ができる	╄			
		4	粉っぽさ等の吸入感を感じる事ができる	1	2	3	
③mdi		1	チェック項目 容器を十分に振り、ボンベを押し(押せない場合は補助具を使って)正しく噂	1	2	3	4
		2	霧することができる 呼気位から、息を吸い始めると同時にボンベを押し、ゆっくり5秒程度かけで 吸入することができる	5			
		(3)	約5秒間、息を止めることができる	+			
			保護噴霧回数を知っている				
		⑤	決められた日数で取りかえる事を理解している				
			チェック項目	1	2	3	4
		1	アルミシートを切り離してカプセルを番号順に1つずつ取り出すことができる)			
④ハンディヘラー		2	キャップとマウスピースをあけ、カプセルをセットしてからマウスピースをカチッと閉める				
		3	緑のボタンを押すことができる 息を吐いてからマウスピースをくわえ、肺の中に薬剤が到達するイメージで				
		4	吸い込む				
	무	0	苦しくない程度に息を止めることができる 東がマウスピースを思け、カプセルをハンディムラーとU序接換でる	+			
		<u>(6)</u>	再びマウスピースを開け、カプセルをハンディヘラ―より直接捨てる チェック項目	1	2	3	4
		(1)	デェック項目 キャップの両側を軽く押して引っ張り出し、外す	+-		J	+
⑤ジェヌエア	片	\sim	吸入器を水平に持ち、ボタンを最後までしつかりと押して離す	+			
	片	<u>2</u>	吸入品で小十に行う、バブンで取扱よでしてがりと作じて触す 自を叶いてから吸入口を軽くかんで長で匀むようにくわえ 強く深く吸い込む				

問い合わせ先 独立行政法人国立病院機構旭川医療センター TEL:0166-51-3161(代表) 〒070-8644 北海道旭川市花咲町7-4048 FAX:0166-55-2961(薬剤科)

□ ④ 苦しくない程度に息を止めることができる 医師に伝えたい事 【吸入指導結果、ご不安な点等があればこちらにご記入下さい】

薬剤師の先生方へ

患者さんに指導後、FAX送信よろしくお願い致します。旭川医療センター FAX:0166-55-2961(薬剤科)

吸入指導報告書

初回

3

4

			/// / J H -17						- 4
【薬剤師記	入	^ -	ージ】	指導日	年		月		日
薬局名				薬剤師名					
患者氏名									
指導を受けた人	□≉	人口	□ 配偶者 □ 子供 □ ヘルパー □ その他						
指導回数	□ 1	□ 初回 □ 2回目 □ 3回目						不明]
			評価の目安 1.できか	こ 2.ほぼできた 3.な	んとかでき	た 4.	できな	こかった	-
	注	意	【共通必須	項目】		1	2	3	4
アドヒアランス			服薬のタイミングについて話し合い、生活 できている(歯磨き前、食事前)	の中に組み入れる事か	Ĭ,				
			1回の吸入量(回数)と1日の吸入回数について話すことができる						
			継続治療の重要性について理解している						
副作用			うがいの方法を理解し、かつ実行している						
			声がれ、口腔カンジダ、動悸などについて理解している				0	0	
以下の薬剤の指導			チェック項	•	- + 7 / -	1	2	3	4
⑥レスピマット		1	カートリッジを正しく挿入し、初めて吸入す ち4回)	る削に必要な準備かで	ざる(空打				
)	透明ケースを「カチッ」と音がするまで180度回転させることができる						
		3	キャップを完全に開け、息をゆっくり最後まで吐き出す						
		4	マウスピースをしっかり口にくわえ、息を口からゆっくりと吸いながら、噴霧ボタンを押し薬剤をゆっくり深く吸う						
		5	決められた日数で吸入器ごと交換することを理解している						
		チェック項目				1	2	3	4
		1	ラベルに「表 水平」と表示している面を上	こに向けて持って構える					
		2	青色の押しボタンを「カチッ」と音がして止まるところまで押すことができる						
		3	指の力を抜いて、ボタンを元の状態に戻すことができる						
⑦スイングヘラー		4	マウスピースをくわえる前に息を吐く						
		5	マウスピースと唇の間に隙間ができないようにマウスピースをくわえ、はやく深く息を吸い込む						
		6	マウスピースから口を離し、数秒間息を止め、その後ゆっくり息を吐く						
			チェック項	目		1	2	3	4
⑧ブリーズヘラー		1	キャップを取り外し吸入口を開け、アルミ 填部に入れる	シートから取り出した1カ	プセルを充				
		2	「カチッ」と音がするまでしっかりと吸入口	を閉じる					
		3	吸入器を上に向けて持ち、両側の色つき 同時に押し、ボタンを離す	のボタンを「カチッ」と音	がするまで				
		4	息を十分吐き出してから吸入口をしっかり 出来る限り深く息を吸い込む(カプセルが						

吸入口を開き、本体を横に倒して空のカプセルを捨て、吸入口を閉じて 6 キャップを元に戻す 4 チェック項目 2 3 カバーを「カチッ」と音がするまで開けることが出来る 1 息を吐き出してから、通気口を指でふさがないよう注意し、吸入口をくわえ、 ⑨エリプタ 強く深く「スーッ」と息を吸い込むことができる

吸入口を開けてカプセル内に薬が残っていないことを確認する(カプセルが

粉っぽさ等の吸入感を感じることができる **4** チェック項目 1 2 キャップを外し、よく振る (1) ①エアロスフィア 吸入口をくわえ、息をゆっくり深く吸いながら、噴霧されるまでボタンを押す

3 吸入口から唇を離し、3秒以上息を止めた後、息をゆっくりと吐きだす 【吸入指導結果、ご不安な点等があればこちらにご記入下さい】 医師に伝えたい事

甘味を感じる)

空になっていれば吸入出来ている)

苦しくない程度に息を止めることができる